

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Fine Agrochemicals Ltd., Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania i Irlandii Północnej, tel.: +44 01905 361800.

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Amagro Sp. z o.o., ul. Lambady 10, 02-830 Warszawa,
tel.: 22 644 65 64, fax: 22 644 65 35, office@amagro.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

*DAZIDE ENHANCE 85 SG

Zawartość substancji aktywnej:
daminozyd kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamonowy
(związek z grupy hydrazydów) - 85 %

Zezwolenie MRiRW nr R-29/2011 z dnia 18.04.2011 r.

piktogramy:

4 - Chronić dłonie /Używać rękawic

5 - Chronić twarz /Używać ekranu ochronnego

6 - Ręce myj pod bieżącą wodą

14 - Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do stosowania w uprawie chryzantemy pod osłonami, w celu skrócenia międzywęźli, uzyskania korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenia równomierności wzrostu i kwitnienia. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych.

ZAKRES STOSOWANIA

CHRYZANTEMA (uprawiana na kwiat cięty)

Skrócenie międzywęźli, uzyskanie korzystnego pokroju roślin oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia.

Zalecane stężenie: 0,3 % (300 g środka w 100 l wody).

Termin stosowania: Opryskiwać w 3-5 tygodniu po zasadzeniu, w zależności rozwoju roślin.

Wykonać maksymalnie 2 zabiegi, nie częściej niż co 7-10 dni.

Uwagi:

Opryskiwać rośliny aż do całkowitego pokrycia cieczą użytkową powierzchni liści i pędów, lecz nie dopuścić do spływania cieczy.

Stosować na rośliny suche, zdrowe, dobrze ukorzenione.

Nie podlewać roślin w ciągu 24 godzin po wykonaniu zabiegu.

Środka nie mieszać z innymi środkami ochrony roślin.

Unikać nakładania się pasów opryskiwania aby nie dopuścić do przedawkowania środka.

Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

OKRES KARENCEJII okres od ostatniego dnia zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0oC do 30oC.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowanie traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUMB RAK, S TOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE .

POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - 58 682 04 04
Kraków - 12 411 99 99
Lublin - 81 740 89 83
Łódź - 42 657 99 00
Poznań - 61 847 69 46

Rzeszów - 17 866 40 25
Sosnowiec - 32 266 11 45
Tarnów - 14 631 54 09
Warszawa - 22 619 66 54
Wrocław - 71 343 30 08

Okres ważności - 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -